

Mordedura

Guia prático de prescrição para mordeduras incluindo antibioticoterapia profilática, analgesia, profilaxia antitetânica e orientações para manejo no PS e alta domiciliar.

Paciente típico: Adulto normotrófico, previamente hígido, sem alergias conhecidas, vítima de mordedura por animal doméstico (cão/gato) ou humana com ferimento punctiforme ou laceração em extremidades, apresentando dor local e possível risco infeccioso.

? Guia rápido

! Clique nos tópicos abaixo para ver detalhes

História clínica típica

História Clínica

Paciente relata que há cerca de [] horas sofreu mordedura por [cão/gato] [doméstico/ desconhecido], com vacinação antirrábica [atualizada/ desconhecida].

Refere dor moderada em local do trauma. Nega febre, mal-estar, náuseas ou outros sintomas associados.

Nega alergias.

Exame Físico

Estado geral regular, consciente, orientado, vigil, hidratado, afebril.

Presença de lesão [extensa/ punctiforme] em [], com bordas regulares, profundidade superficial a moderada, sem sangramento ativo.

Presença de dor à palpação local, sem sinais de celulite, abscesso ou linfangite.

Demais sistemas sem alterações relevantes.

Hipótese Diagnóstica

- Ferimento por mordedura

Conduta

- Realizada limpeza abundante da ferida com soro fisiológico 0,9%.
- Realizada desinfecção com solução antisséptica. Sutura não realizada devido a risco de infecção.

- Oriento/Realizo profilaxia antitetânica e antirrábica.
- Prescrevo sintomáticos e antibioticoterapia profilática.

Prescrição padrão para paciente típico

No pronto-socorro:

01. Limpeza e desinfecção da ferida
02. Dipirona 500mg/mL – 01 ampola, IM
03. Vacina Antirrábica - 01 ampola, IM. Orientar demais doses nos dias 3, 7 e 14.
04. Vacina dT - 01 doseL, IM (deltoide)
05. Imunoglobulina antitetânica (250 unidades/mL) - 250 unidades, IM, se acidente grave em paciente com status vacinal desconhecido.

Para casa:

01. Amoxicilina + Clavulanato 875mg + 125mg _____ 08 cp
Tomar 01 comprimido, V0, de 12/12h, por 4 dias.
02. Dipirona 500mg _____ 01 caixa
Tomar 01 comprimido, V0, até 6/6h, se dor ou febre.
03. Ondansetrona 4mg _____ 01 caixa
Tomar 01 comprimido, V0, até 8/8h, se enjoo ou vômitos.

? NO PRONTO-SOCORRO

• ⚠ MANEJO E CUIDADOS INICIAIS

- Limpeza abundante da ferida com soro fisiológico 0,9%
- Avaliação da necessidade de sutura (evitar em mordidas de mão e ferimentos punctiformes)
- Verificar situação vacinal antitetânica do paciente
- Avaliar necessidade de profilaxia antirrábica conforme protocolo local

• IMUNOGLOBULINA ANTITETÂNICA (Tetanogamma®)

◦ Prescrição:

- Imunoglobulina antitetânica 250 UI – 01 ampola, IM, dose única

- **Indicações:** Profilaxia pós-exposição em ferimentos tetanogênicos
- **Apresentações:** Ampola 250 UI
- **Via(s):** □ IM
- **Cuidados:**
 - Aplicar em glúteo médio
- **Alternativa(s):**
 - Vacina antitetânica dT – 01 dose , IM

• VACINA ANTIRRÁBICA

- **Prescrição:**
 - Vacina Antirrábica - 01 ampola, IM
- **Indicações:** Profilaxia pós-exposição
- **Apresentações:** Ampola de 0,5 ou 1mL
- **Via(s):** □ IM
- **Alternativa(s):**
 - Soro heterólogo antirrábico (1.000 UI/5mL) - 40 UI/kg (dose máxima: 3.000 UI, ou 15 mL)

• DIPIRONA (Novalgina®, Anador®)

- **Prescrição:**
 - Dipirona 500mg/mL – 01 ampola, IM
 - Dipirona 500mg/mL – 01 ampola + 10mL ABD, EV
- **Indicações:** Analgesia e antitérmica
- **Apresentações:** Ampola 500mg/2mL | Ampola 1g/2mL
- **Via(s):** □ Oral | □ EV | □ IM
- **Cuidados:**
 - Repetir a cada 6h se necessário
 - Contraindicado em alergia a pirazolônicos
- **Alternativa(s):**
 - Paracetamol 500mg – 01 comprimido, VO, 6/6h
 - Tramadol 100mg/2mL – 01 ampola + 100mL SF0,9%, EV lento

• ONDANSETRONA (Vonau®, Zofran®)

- **Prescrição:**
 - Ondansetrona 4mg/2mL – 01 ampola + 100mL SF0,9%, EV
 - Ondansetrona 4mg/2mL – 01 ampola, IM
- **Indicações:** Antiemético para náuseas e vômitos
- **Apresentações:** Ampola 4mg/2mL | Ampola 8mg/4mL
- **Via(s):** □ Oral | □ EV | □ IM
- **Cuidados:**

- Correr EV em 20 minutos
- Repetir a cada 8h se necessário
- **Alternativa(s):**
 - Bromoprida 10mg/2mL – 01 ampola, IM
 - Metoclopramida 10mg/2mL – 01 ampola, IM

? PARA CASA

• AMOXICILINA + CLAVULANATO (Clavulin®, Amoxil®)

- **Prescrição:** Amoxicilina + Clavulanato 875mg + 125mg – Tomar 01 comprimido, VO, de 12/12h, por 4 dias
- **Indicações:** Profilaxia infecciosa em mordeduras com risco
- **Apresentações:** Comprimido 875mg + 125mg | Suspensão oral
- **Posologia:** 875mg + 125mg, VO, 12/12h por 3 dias (profilaxia) ou 5-7 dias (tratamento)
- **Cuidados:**
 - Tomar com alimentos para reduzir efeitos GI
 - Contraindicado em alergia à penicilina
- **Alternativa(s):**
 - Clindamicina 300mg – Tomar 01 cápsula, VO, de 8/8h + Ciprofloxacino 500mg – Tomar 01 comprimido, VO, de 12/12h, por 3 dias
 - Cefalexina 500mg – Tomar 01 cápsula, VO, de 6/6h, por 3 dias

• DIPIRONA (Novalgina®, Anador®)

- **Prescrição:** Dipirona 500mg – Tomar 01 comprimido, VO, até 6/6h, se dor ou febre
- **Indicações:** Analgesia e antitérmica
- **Apresentações:** Comprimido 500mg | Gotas 50mg/mL
- **Posologia:** 500mg, VO, até 6/6h, conforme necessário
- **Cuidados:**
 - Dose máxima: 4g/dia
 - Evitar uso prolongado
- **Alternativa(s):**
 - Paracetamol 500mg – Tomar 01 comprimido, VO, de 6/6h
 - Ibuprofeno 600mg – Tomar 01 comprimido, VO, de 8/8h

• BROMOPRIDA (Plamet®)

- **Prescrição:** Bromoprida 10mg – Tomar 01 comprimido, VO, até 8/8h, se enjoo ou vômitos
- **Indicações:** Antiemético para náuseas e vômitos

- **Apresentações:** Comprimido 10mg | Gotas 4mg/mL
- **Posologia:** 10mg, VO, até 8/8h, conforme necessário
- **Cuidados:**
 - Evitar uso prolongado
 - Pode causar sonolência
- **Alternativa(s):**
 - Ondansetrona 4mg – Tomar 01 comprimido, VO, de 8/8h
 - Metoclopramida 10mg – Tomar 01 comprimido, VO, de 8/8h

- **📋 Orientações ao paciente**

- Retornar para o PS se piora dos sintomas, sinais de infecção (febre, rubor, calor, edema, secreção) ou dor progressiva após 48-72h.
- Manter ferimento limpo e seco, realizar curativo diário.
- Buscar UBS para atualização vacinal antitetânica se necessário.
- Procurar vigilância epidemiológica para avaliação de profilaxia antirrábica se aplicável.

? CID-10:

- **W54.9:** Mordedura ou golpe provocado por cão - local não especificado
- **W55.9:** Mordedura ou golpe provocado por outros animais mamíferos - local não especificado
- **Y04.1:** Agressão por meio de força corporal - mordedura de pessoa

Revision #11

Created 7 August 2025 07:43:28 by Heric

Updated 24 September 2025 23:23:54 by Heric